



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
SAÔNE-ET-LOIRE



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
CÔTE-D'OR

# Sorgho fourrager



## Conduite de la culture

**Semis** : jusqu'au 10 juillet, 20 kg/ha, avec un semoir à céréales classique (1 rang sur 2) et bien tasser le sol s'il est sec.

**Variétés** : Plante exigeante en température : utiliser des variétés précoces ou intermédiaires de préférence hybrides

**Fertilisation azotée** : 40 à 60 unités après s'être assuré du bon démarrage de la culture, et 30 unités après une coupe

**Désherbage** : **Pas toujours nécessaire d'intervenir ; si nécessaire de 3 à 4 feuilles du sorgho**

Contre dicots et graminées : Isard 1,2 l/ha ou Mikado 0,5 l/ha

Contre les dicots, Basagran SG à 1,5 kg/ha, Basamaïs 2,5 l/ha, ou Cadeli 1,5 l/ha

## Valorisation

**Utilisation** : Pâturage, affouragement ou ensilage, de préférence **ensiler la première coupe**

**Repousse** : oui à l'automne

**Tonnage produit** : 10 à 12 T de MS/ha

**Valeur alimentaire** :

MS: 35 %

UF (par kg de MS) : 0,62 – 0,72

PDIN (par kg de MS) : 55 – 60

PDIE (par kg de MS) : 60 – 70

**Valorisation pour les animaux** :

Croissance rapide

Exemple d'utilisation : pâturage de 200 brebis (en début de gestation) pendant 20 jours sur 1,5 ha de sorgho fourrager

☹️ **Toxique si hauteur d'entrée au pâturage inférieure à 60 cm**

**Pas de gel avant la récolte, besoin en température**

😊 **Bonne alternative au maïs ensilage**  
**Faible besoin en eau et forte productivité**