



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
SAÔNE-ET-LOIRE



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
CÔTE-D'OR

Avoine («brésilienne ou de printemps») + Vesce



Conduite de la culture

Semis : jusqu'au 1er août :

90 kg/ha d'avoine de printemps

+ 60 kg/ha de vesce

ou 25 kg/ha d'avoine «brésilienne» + 60 kg/ha de vesce

Variétés : avoine de printemps ou vesce commune type hiver ou printemps
L'avoine brésilienne pousse plus rapidement que l'avoine classique et elle est moins sensible aux viroses et à la rouille couronnée.

Fertilisation azotée : 0 à 40 unités d'azote en fonction du potentiel et du développement des protéagineux

Valorisation

Utilisation : Pâturage, ensilage ou enrubannage

Repousse : non

Tonnage produit : 2 à 4 T de MS/ha

Valeur alimentaire :

MS: 35 %

UF (par kg de MS) : 0,75 – 0,80

PDIN (par kg de MS) : 70 - 75

PDIE (par kg de MS) : 80 - 85

Valorisation pour les animaux :

Mélange d'avantage destiné à la fauche

Au pâturage, gaspillage possible par piétinement

Distribution de l'enrubannage à accompagner de paille



Au pâturage, attention au piétinement



Pousse rapide et importante

Mélange équilibré en terme de valeur alimentaire