

# AUDIT D'EXPLOITATION – filière Bovin viande

## Territoire : « Mâconnais » - Mâcon

### Fiche de sensibilisation aux impacts du changement climatique sur les pratiques agricoles



## Face au Changement Climatique : Construire l'Agriculture de Solutions

### Positiver le lien entre agriculture et climat.


Il est avéré que l'accélération de l'augmentation des températures est due aux émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les activités humaines (agriculture, bâtiments, déchets, production d'énergie, industrie, transports). L'agriculture a réellement une posture singulière car elle est à la fois impactée, contributrice et apporteuse de solutions. En effet, le «secteur des terres» peut jouer un rôle majeur et pourrait contribuer de 20 à 60% au potentiel d'atténuation des émissions de GES d'ici 2030 grâce au rôle de l'agriculture et de la forêt en tant que pompe à carbone, permettant de **stocker le carbone** et de **compenser les émissions des autres secteurs**, par la production de matériaux et d'énergies renouvelables et par une évolution des modes de production.

Afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, l'agriculture doit s'engager dans une réflexion globale et systémique pour, à terme, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des solutions existent, notamment, les recours préférentiels à l'azote organique et au développement des légumineuses ou de l'agroforesterie.

Les arbres et les haies assureront la protection et l'enrichissement en carbone des sols, la réduction du risque de stress hydrique, ainsi que des abris naturels aux animaux d'élevage.

Le rôle de l'agriculture et de la forêt dans la lutte contre le changement climatique est reconnu depuis **la COP21 organisée en 2015**. Elle est inscrite dans les accords de Paris, et a donné une réelle légitimité à l'initiative «4 pour 1000» au travers de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

La SNBC s'appuie sur un scénario prospectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, sans faire de paris technologiques. Celui-ci permet de définir un chemin crédible de la transition vers cet objectif, d'identifier les verrous technologiques et d'anticiper les besoins en innovation.



#### Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français pour le secteur agricole

entre 1990 et 2050 (en MtCO<sub>2</sub>eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)


Les effets du changement climatique se font ressentir depuis plusieurs années. L'agriculture y est particulièrement sensible. Pour rester compétitives les exploitations doivent relever le défi de l'adaptation et de l'atténuation.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) envisage quatre futurs possibles selon des évolutions de contexte socio-économique, des efforts de réduction des GES dans le temps par secteur et par pays et le rôle des différents leviers de changement : politique, technologie, comportemental. Chaque scénario correspond à une concentration atmosphérique en gaz à effet de serre à l'horizon 2100. L'impact de cet effet de serre sur le climat est calculé à l'aide du forçage radiatif (c'est-à-dire la modification du bilan radiatif de la planète). Le bilan radiatif représente la différence entre le rayonnement solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis par la planète.

**Plus cette valeur est élevée, plus le système terre-atmosphère gagne en énergie et se réchauffe.**

Evolution de la température moyenne mondiale de 1900 à 2100

(écart à la moyenne 1971-2000). Source : GIEC, 2013.



- L'adaptation : « je me sauve moi-même et je gère l'inévitable »
- L'atténuation : « je sauve mes enfants et j'évite l'ingérable »



## Projections Climatiques – Qu'est-ce que c'est ?

L'outil ClimA XXI vise à produire des éléments chiffrés et d'analyse afin de prendre la mesure du sujet et permettre à l'agriculture de percevoir l'influence du réchauffement climatique sur ses pratiques. Il permet de partager la vision des constats, l'impact des menaces et les solutions possibles.

Les projections climatiques sont réalisées par les climatologues, et utilisées notamment dans les travaux du GIEC. Elles permettent de décrire les évolutions climatiques à venir, pour différentes hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs localisations sont analysées, ainsi que plusieurs filières sur un même département. L'étude simule l'évolution d'indicateurs climatiques (descripteurs climatiques comme le cumul des précipitations journalières) ou d'indicateurs agro-climatiques (descripteurs en lien avec l'agriculture comme la date de mise à l'herbe).

Les indicateurs sont calculés à partir de projections climatiques fournies par le portail «DRIAS – les futurs du climat» développé par Météo-France. Un seul modèle climatologique et un seul scénario d'émissions de gaz à effet de serre sont utilisés pour ces études,


- Les comparaisons portent sur 3 périodes de **30 ans, représentant des horizons de temps différents** :

- Les années **1990** (1976-2005) : **période de référence**
- Les années **2030** (2021-2050) : **futur proche**
- Les années **2080** (2071-2100) : **futur lointain**

Il s'agit de données modélisées (passées comme futures). **Ce ne sont pas des prévisions, mais des projections !**

ClimA XXI est un outil éprouvé depuis plusieurs années sur le territoire français.

Les projections climatiques seront calculées sur la base du scénario **RCP 8.5**, scénario qui s'avère le plus réaliste car il correspond à la prolongation des émissions actuelles.



# Territoire « Mâconnais » alt. 175 - 400 m : Commune « Mâcon »



Le sud de la région Bourgogne-Franche-Comté est marqué par un climat à la triple influence continentale, océanique et méridionale. Le climat est plus chaud que le reste de la région, avec un nombre de jours de gel plus faible et des étés chauds. La vallée de Saône orientée nord-sud protégée des masses d'air océanique par les reliefs n'enregistre pas plus de 850 mm d'eau par an. Les exploitations qui produisent des grandes cultures sont le plus souvent mixtes (viticulture, élevage allaitant, élevage de chèvre ...).

Les sols à majorité limoneux sont profonds à fort potentiel, les grandes cultures sont essentiellement représentées par du blé et du maïs (grain et ensilage) avec de l'orge d'hiver et du colza. Plus localement, les sols inondables du val de Saône, essentiellement des alluvions argileuses sont exploités en prairies permanentes ou en en maïs grain.



Quelles que soient les projections, les sources et données sont identiques

- Source : DRIAS/CNRM 2020

- Nature : PROJECTIONS CLIMATIQUES - MODELE ALADIN - SCENARIO RCP8.5

- Horizons temporels analysés : référence 1976-2005, Futur proche 2021-2050, Futur lointain 2071-2100



## Indicateurs Climatiques et Agroclimatiques

### Liste des indicateurs étudiés :

#### Généraux

- Températures moyennes annuelles (°C)
- Nombre de jours de gel/an
- Cumuls mensuels des précipitations (mm)
- Pluies efficaces du 01/01 au 31/12 (mm)

#### Prairies

- Nombre de jours chauds par décade où la température maximale est supérieure ou égale à 27°C
- Nombre de jours chauds où la température maximale est supérieure à 35°C du 01/05 au 30/09
- Date de franchissement des 300°J base 0° - initialisée au 01/02 et écrêté à 18 °C
- Date de franchissement des 800°J base 0° - initialisée au 01/02
- Date de franchissement des 1200°J base 0° - initialisée au 01/02
- Date des premières gelées entrée d'hiver

#### Maïs

- Nombre de jours de gel par mois du 01/04 au 15/05
- Nombre de jours où la température est supérieure à 35°C du 01/05 au 30/09
- Date de franchissement de 1600°J base 6°C - initialisée au 15/04

#### Santé du bétail

- Nombre de jours de stress thermique des animaux (THI)








## Températures moyennes annuelles (°C)

En valeurs médianes, nous constatons une augmentation moyenne d'environ **1,1°C dans les années 2030** et de **3,5°C dans les années 2080** par rapport à la période de référence (années 1990).


L'année la plus chaude des années 1990 avec **12,7°C**, est plus fraîche que l'année la plus froide, **13,8°C**, durant les années 2080.






## Nombre de jours de gel/an

Nous constatons une nette diminution du nombre de jours de gel par an au cours du XXI<sup>ème</sup> siècle.

Dans les années 2080, le nombre de jours de gel aura été presque **divisé par quatre** par rapport à la fin du XX<sup>ème</sup> siècle et l'année la plus chaude, il ne gèlera **plus !** La variabilité interannuelle du nombre de jours de gel augmente légèrement dans les années 2030 mais se réduit nettement à la fin du XXI<sup>ème</sup>.



## Cumul mensuel des pluies (mm) - médianes trentenaires



**A Mâcon**, la répartition mensuelle des pluies (médianes) évolue du milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle à la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle.

Au milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle (par rapport à la fin du XX<sup>ème</sup> siècle), on constate :

- Une **augmentation de la pluviométrie** médiane annuelle de 857 à 939 mm ;
- Une **hausse des précipitations** est observée toute l'année, surtout en **janvier (+ 18 mm)** et **juillet (+ 15 mm)** et en **février** et **mars** et de **septembre à novembre (environ + 10 mm/mois)**.
- Une **stabilité (à + ou - 5 mm/mois)** des précipitations médianes d'avril à juin, en août et en décembre.


A la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle (par rapport à la fin du XX<sup>ème</sup> siècle), on constate :

- Une **augmentation des précipitations** médianes annuelles de 857 mm à 977 mm ;
- Une hausse des précipitations est plus visible pour les mois d'hiver **d'octobre à avril inclus (environ + 11 à 28 mm/mois)** et en **juin (+ 14 mm)**.
- Une légère diminution des précipitations uniquement en fin de printemps et été : **mai (- 9 mm)**, **juillet (- 7 mm)**, **août (- 10 mm)** et **septembre (- 6 mm)**.





## Pluies efficaces mensuelles du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre (mm)



**Définition** : Après un épisode pluvieux, une partie de l'eau tombée au sol retourne dans l'atmosphère par évapotranspiration (phénomène cumulant l'évaporation de l'eau et la transpiration des plantes) : elle ne bénéficie donc pas aux nappes souterraines et aux milieux aquatiques de surface. L'autre partie ruisselle - potentiellement vers les milieux - s'infiltré dans le sol - et recharge potentiellement les nappes : elle constitue la pluie efficace.

Comparé à la période de référence, les données observées pour la 1<sup>ère</sup> moitié du XXI<sup>ème</sup> siècle semblent assez proches, sauf au printemps et en été : avec un déficit plus élevé d'environ 10 mm en avril, 20 mm en mai et juin, 3 mm en juillet et 14 mm en août. Mais **en année médiane, le déficit P-ETP cumulé de juin à août inclus restera stable** en valeur médiane ou pour le décile le plus sec.




A l'inverse, nous observons une **baisse significative des pluies efficaces** à la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle. Les mois de mai à septembre sont fortement impactés par cette baisse, avec notamment **- 67 mm en moins de juin à août inclus** en médiane par rapport aux années 1990.

Cette baisse sera la conséquence d'un **assèchement des sols plus important**, ce qui impactera négativement les prairies surtout en sols séchant et superficiels.



## Quel avenir pour les prairies ?

**Ralentissement de la pousse de l'herbe et début du stress thermique :**  
*nombre de jours chauds où la température maximale est supérieure ou égale à 27°C du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre :*



- A l'avenir, le nombre de jours où la température sera supérieure à 27°C va augmenter. Par conséquent, la pousse de l'herbe sera ralentie.


- Comparé à la période de référence, la première moitié du XXI<sup>ème</sup> siècle sera synonyme d'un ralentissement précoce de la pousse de l'herbe avec 2 semaines d'avance sur le calendrier. Par ailleurs, le nombre de jours à plus de 27°C va augmenter (+ 10 jours en plus), et ce, sur les mois de mai à septembre.

- Comparé à la période de référence, on observe d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle, une pousse de l'herbe ralentie sur un pas de temps plus long, et ce, de manière régulière. De fait, la période de ralentissement de la pousse de l'herbe sera avancée de 4 semaines et même rallongée de 2 semaines. De plus, le nombre de jours à plus de 27°C l'été va tripler, il passera de 21 à 69 en valeur médiane, avec des pics importants entre mi juin et début septembre.

Les valeurs les plus élevées qui arrivaient seulement 1 année sur 10 dans le passé, deviendront la norme d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle.

**Arrêt de la pousse de l'herbe :**  
*nombre de jours où la T°C est > à 35°C (du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre)*

Nombre de jours par an où T max >=35°C  
 du 01/05 au 30/09  
 Simulation ClimA XXI, Scénario RCP 8.5



- Les jours atteignant une température supérieure ou égale à 35°C correspondent à l'arrêt de la pousse de l'herbe.

Ce nombre ne va pas sensiblement bouger d'ici le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle mais va considérablement s'accroître d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle avec 8 jours en plus que la période de référence.

- L'arrêt de la pousse de l'herbe apparaîtra principalement sur la période estivale.





## Quel avenir pour les prairies ?


### Avancement de la date de mise à l'herbe :

*date de franchissement des 300°J base 0° initialisé au 1<sup>er</sup> février et écrêté à 18°C*

Nous constatons un **avancement marqué de la date de franchissement des 300°C**, qui correspond normalement à la **date de mise à l'herbe**.

De fait, il y a environ 6 jours de différence entre la période de référence et le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle. Cet avancement est d'autant plus important d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle **avec 14 jours d'avance comparé aux années de référence**.

Un avancement de la date de franchissement des 300°C jours devraient être synonyme d'un avancement de la date de la mise à l'herbe. Ceci permettrait de **compenser le manque d'herbe prévu durant les étés futurs**. Néanmoins, la mise en pratique de cette dernière sera réalisable **sous réserve de pouvoir rentrer dans les parcelles**. En effet, des problèmes de portance risquent d'apparaître au vu des pluviométries hivernales élevées et concentrées.




### Avancement de la date de fauche des prairies :

*date de franchissement des 800°J base 0° initialisé au 1<sup>er</sup> février*

Nous constatons un **avancement marqué de la date de franchissement des 800°C**, qui correspond à la **date de fauche des prairies**.

De fait, il y a environ 6 jours de différence entre la période de référence et le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle. Cet avancement est d'autant plus important d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle **avec 17 jours d'avance comparé aux années de référence**.

Le franchissement précoce des 800°C jours pourrait aussi être synonyme d'un avancement de la date de fauches des prairies. Ceci pourrait permettre de **compenser le manque de fourrage à prévoir durant les étés**. Il faudra aussi sûrement compléter cette pratique avec des **fauches de regain qui arriveront plus tardivement dans l'année vers le mois d'octobre** au retour des conditions climatiques plus propices à la pousse de l'herbe.




### Avancement de la date limite de fauche des prairies (foin tardif) :

*date de franchissement des 1200°J base 0° initialisé au 1<sup>er</sup> février*

La date de franchissement de 1200°C jours correspond à la date de fauche limite pour les prairies.

Comparé à la période de référence, la date limite de fauche pour le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle sera **avancée de 8 jours**. Cette date de franchissement future n'arrivait qu'1 année sur 10 dans le passé.


Comparé à la période de référence, la date limite de fauche pour la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle sera quant à elle **avancée de 20 jours**.





## Quel avenir pour les prairies ?

### Retard des dates de semis des prairies : date de première gelée entrée d'hiver



Date de première gelée entrée d'hiver

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maximum        | 12-déc.        | 22-déc.        | 29-déc.        |
| 9ème décile    | 19-nov.        | 30-nov.        | 21-déc.        |
| 4ème quintile  | 17-nov.        | 27-nov.        | 8-déc.         |
| <b>Médiane</b> | <b>10-nov.</b> | <b>16-nov.</b> | <b>29-nov.</b> |
| 1er quintile   | 29-oct.        | 31-oct.        | 12-nov.        |
| 1er décile     | 25-oct.        | 25-oct.        | -              |
| Minimum        | 14-oct.        | -              | -              |

Nous constatons qu'entre la période passée et celle du milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle, **les premières gelées arriveront 6 jours plus tard**. A la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle, la date de première gelée interviendra 19 jours plus tard qu'à la fin du XX<sup>ème</sup> siècle. La date médiane obtenue dans le passé, arrivera près de moins d'une fois sur 5 d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle.

Pour semer des prairies temporaires dans de bonnes conditions, il est nécessaire qu'elles aient un développement suffisant avant l'arrivée du gel. C'est pourquoi, dans le futur, il sera possible de **retarder les semis de prairies**. Cette pratique sera même recommandée pour **profiter du retour des pluies automnales** et des températures plus propices à la pousse de l'herbe.

## Quel avenir pour le maïs ?

### Avancement de la date de semis :

*nombre de jours de gel (< 0°C) par mois du 1<sup>er</sup> avril au 31 mai*

Habituellement, l'apparition d'une **période de gel après le stade 6 feuilles du maïs est très préjudiciable** à la culture. C'est pourquoi, il était important de ne pas semer trop tôt. **Ce risque disparaîtra d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle**.

Comparé au passé, le nombre de jours de gel au printemps est plus restreint d'ici le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle avec pour 9 années sur 10 : **1 jour de gel au lieu de 3**. Les jours de gel seront **presque inexistants d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle**.

### Diverses stress : nombre de jours où la T°C est > à 35°C du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre

Le nombre de jours supérieurs à 35°C durant l'été ne va **pas sensiblement évoluer d'ici le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle** mais va considérablement **s'accroître d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle avec 8 jours en plus** que la période de référence.

Durant cette période, le maïs peut subir plusieurs stress tels que la **perturbation dans la multiplication des cellules** (cas d'un stress précoce, avant grain laiteux) ou un **ralentissement brutal du remplissage des grains** (cas d'un stress thermique plus tardif, vers grain laiteux-pateux).

### Avancement de la date de récolte du maïs ensilage :

*indice ½ précoce, date de franchissement des 1600°C base 6° initialisée au 15 avril*

La date de franchissement des 1600°C jours correspond à la **période de récolte du maïs fourrage**.

L'augmentation des températures sur le futur va être visible et se faire sentir sur les cultures.

De fait, comparé au passé, la **date de récolte du maïs sera atteinte environ 9 jours tôt** d'ici le milieu du XXI<sup>ème</sup> siècle **et environ 1 mois plus tôt d'ici la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle**.

Les dates de récoltes obtenues précocement dans le passé 1 année sur 10 seront toujours plus tardives que les récoltes de la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle.

|                | 1976-2005      | 2021-2050      | 2071-2100      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maximum        | 01-oct         | 29-août        | 12-août        |
| 9ème décile    | 07-sept        | 26-août        | 06-août        |
| <b>Médiane</b> | <b>28-août</b> | <b>19-août</b> | <b>31-juil</b> |
| 1er décile     | 15-août        | 06-août        | 23-juil        |
| Minimum        | 09-juil        | 03-août        | 19-juil        |





## Quel avenir pour le bétail ?

### Stress thermique des animaux :

évolution projetée des classes de 'stress' en nombre de jours par an (médiane)


Temperature Humidity Index – THI calculé à partir de la température et de l'humidité

La thermorégulation des bovins est nécessaire dès 15°C (source INRA 2018) et le stress thermique démarre dès 22°C à 50 % d'humidité et 24°C à 30 % d'humidité.


- En stress thermique, les vaches boivent plus, mangent moins et ruminent moins.

A l'avenir, avec l'augmentation des températures, pour un certain niveau d'humidité, le stress des bovins va augmenter. Nous observons une **augmentation de 21 % du stress thermique chez les bovins** au cours du XXI<sup>ème</sup> siècle, avec notamment une augmentation de 5 à 8 jours de chacune des catégories : stress léger, stress moyen et stress élevé.

A la fin du XXI<sup>ème</sup> siècle, le nombre de jours de stress thermique est presque doublé, avec une augmentation considérable du nombre de jours de stress élevé et l'apparition du stress extrême.



Evolution des classes de THI en nbre de jours par an (médiane par période de 30 ans)



L'accroissement du stress thermique dans le futur aura des **conséquences non négligeables sur les animaux** : leur santé (voire leur survie), leur production et leur reproduction. C'est pourquoi, les pratiques actuelles de conduite du troupeau en bâtiment comme au pâturage doivent être adaptées.

- **Sur le court terme**, des leviers peuvent être mis en place : augmentation **des zones d'ombrages** (abris, haies, bosquets...etc.) et **des points d'eau**, avancement de la **mise à l'herbe**, choix des **espèces prairiales adaptées**...
- **Sur le moyen terme**, la gestion du troupeau au **pâturage en été risque d'être chamboulée voire impossible**, la **conduite estivale du troupeau s'apparenterait donc à celle hivernale**. En plus des leviers cités ci-dessus, des actions sont envisageables : redistribution de fourrages au pré, conduite du troupeau à l'abri (en bâtiment avec installation de confort thermique) ; pour un retour au pâturage à l'automne.

# Indicateurs Agro Climatiques croisés

## Mâcon:

légende: référence 1976-2005

— 2021-2050 (RCP 8.5)

— 2071-2100 (RCP 8.5)



11,5 °C en moyenne par an


12,6 °C en moyenne par an

15 °C en moyenne par an

|                           | Janv.  | Févr.  | Mars   | Avril   | Mai     | Juin    | Juil.   | Août    | Sept.   | Oct.    | Nov.   | Déc.   |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 11,5 °C en moyenne par an | 1,9 °C | 4,1 °C | 7,7 °C | 10,7 °C | 14,8 °C | 18,2 °C | 20,7 °C | 20,5 °C | 16,2 °C | 11,7 °C | 6,5 °C | 3,9 °C |
| 12,6 °C en moyenne par an | +1,9°C | +1,1°C | +1,1°C | +1,3°C  | +0,7°C  | +0,7°C  | +1,3°C  | +0,9°C  | +1,4°C  | +1,5°C  | +0,6°C | +0,4°C |
| 15 °C en moyenne par an   | +3,9°C | +3,4°C | +2,4°C | +3,4°C  | +3,9°C  | +3,2°C  | +4,5°C  | +4,6°C  | +4,9°C  | +3,9°C  | +3,4°C | +2,2°C |

Nbre jours >27°C 01/05 au 31/10

|  | 0                                   | 0 | 0 |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | jours à plus de 27°C                |   |   |
|  | médiane mensuelle du 01/05 au 31/10 |   |   |



857 mm de pluie par an

939 mm de pluie par an

977 mm de pluie par an

|  | 175 mm  | 501 mm  | 134 mm  |
|--|---------|---------|---------|
|  | + 35 mm | + 38 mm | + 3 mm  |
|  | + 61 mm | + 12 mm | + 35 mm |

STADES

200 °C

300 °C

800 °C

1200 °C

REPERES



HERBE

21-févr

21-mars

06-mai

28-juin

11-févr

15-mars

30-avr

18-juin

01-févr

07-mars

19-avr

04-juin

## Quel avenir pour les prairies et le bétail ?

En général, l'évolution du climat aboutira à une nette avancée du calendrier phénologique de la prairie. De fait, **la pousse d'herbe démarrera plus tôt en sortie hiver**. Cependant, la hausse des températures et la baisse des pluies efficaces principalement durant l'été, seront le résultat d'un **ralentissement voire de l'arrêt de la pousse estivale pour le futur lointain**. Cette pousse reprendra vers l'automne (période des semis de prairies retardées). Cet avancement de la pousse de l'herbe et la reprise tardive permettront de compenser les pertes estivales.

Il faudra aussi **adapter le type d'espèces prairiales** à l'avancement de la pousse de l'herbe et aux nouvelles conditions climatiques. Par ailleurs, l'avancement du calendrier phénologique des prairies pourrait aussi être synonyme d'un **avancement de la fertilisation** organique et minérale, mais tout dépendra de la portance des sols en sortie d'hiver.

➤ Pour la gestion du **stock fourrager**, il sera importante de :

- former des **stocks de fourrages suffisants pour redistribuer si nécessaire l'été**, avec une possible **augmentation de la surface fourragère**. L'avancement des dates de fauches sera nécessaire tant pour la quantité que la qualité des fourrages, avec une **seconde fauche possible à l'automne**.
- **revoir à la baisse le nombre d'UGB** sur l'exploitation, après une **amélioration des performances du troupeau** (réduction des animaux improductifs, augmentation des kilos vifs produits par UGB...).

➤ Pour la **gestion du pâturage** :

- Sur le futur proche, des adaptations de pratiques seront à développer pour profiter au maximum des conditions de pousses précoces et assurer la santé du bétail en été : **avancer la date de mise à l'herbe et augmenter le chargement au pâturage dès la mise à l'herbe (si possible), augmenter les zones d'ombrage et des points d'eau...** Il est cependant important de noter que l'avancement de la mise au pâturage risque d'entrer en conflit avec des problèmes de portance des sols sortie hiver où le cumul des pluies sera plus important.
- Sur le futur lointain : la **gestion estivale risque d'être repensée sous forme de système hivernal (au pré ou en bâtiment) pour éviter le stress du bétail et permettre l'approvisionnement en fourrages, en eau...** Pour optimiser l'utilisation des pâtures, il sera aussi nécessaire **d'accorder un temps de repos aux pâtures** en retirant les animaux au cours de la période estivale et en les ressortant dès la reprise de pousse d'herbe automnale.



## Quel avenir pour le maïs ?

L'évolution du climat, avec une période de gel avancée, l'augmentation des températures et un temps plus sec l'été, va amener à une nette avancée du calendrier phénologique du maïs fourrage.

**Un avancement des semis de maïs sera fortement envisagé avec des variétés tardives** pour allonger le cycle et avoir un gain de rendement, principalement sur la 2<sup>ème</sup> moitié du XXI<sup>ème</sup> siècle.

En effet, **pour éviter un stress hydrique** lors des périodes à risque : levée, floraison, remplissage du grain... **la date de semis pourra être avancée d'une dizaine de jours**. Il est à noter qu'il ne faudra pas semer trop tôt au risque de problème de portance (cumul de pluviométrie important en début d'année ; en amont, préparation du sol plus complexe au vu d'une portance des sols moins importante avec le nombre de jours de gel réduit, ainsi que la réduction des phénomènes de gel/dégel). **Un semis précoce permettra aussi d'augmenter la probabilité de valoriser l'azote** en l'apportant plus tôt pour profiter des pluies plus précoces. Cependant, avec l'augmentation du nombre d'années sans jours de pluie, ou encore la remise en question de l'utilisation des engrais minéraux dans la lutte contre les GES, la valorisation d'effluent organique est plus envisageable pour l'apport de l'azote.

La hausse des températures va aussi engendrer une **favorisation des ravageurs** (taupins, corvidés...).

Le manque d'eau sera aussi synonyme d'une **baisse d'efficacité des désherbants chimiques** : se pose alors la question du désherbage mécanique.


**Le point sensible concernera les apports en eau**, qui sont déterminants dans l'élaboration du rendement. Il sera d'autant plus critique à l'avenir, au vu des risques de conflit quant à l'accessibilité aux ressources en eau. Par temps secs, chauds et peu ou pas d'irrigation, un défi de taille va se poser pour pouvoir cultiver le maïs. Il faudra peut être le remplacer par des cultures plus résistantes au sec.

Les pertes de rendements obtenues seront peut être néanmoins légèrement contrebalancées par une **réduction des charges** : pas de frais de séchage, implanter un précédent prairie temporaire (rupture de rotation, pour valoriser la matière organique MO et l'azote...etc.).


Pour maintenir le niveau de rendement du maïs, il sera aussi possible de **mettre en place d'autres leviers (autres que semis précoces avec variétés tardives) comme le maintien de la fraîcheur des sols** : TCS, binage, apport de MO, couverts...

# Quel avenir pour les prairies ?


## PRAIRIES : pistes d'adaptation à court terme



## PRAIRIES : pistes d'adaptation à moyen terme



## PRAIRIES : pistes d'atténuation





# Quel avenir pour le Maïs ?

## MAÏS : pistes d'adaptation à court terme

### Semis

Léger avancement de la date de semis : allongement du cycle + éviter période de stress (pas trop tôt pour cause de gel ou problème de portance)

### Récolte

Irrigation raisonnée

### Agronomie

Planter le maïs après une prairie temporaire : meilleur rendement

Diversifier sa rotation  
« pas tous les œufs dans le même panier » :  
- Cultures à bas intrants pour garder une marge ou plus résistantes au sec : sorgho, chanvre  
- Cultures méthanogènes

Conserver la fraîcheur des sols :  
TCS, CIPAN, MO

Privilégier les parcelles en limons profonds / hydromorphes

## MAÏS : pistes d'adaptation à moyen terme

### Semis

Avancement de la date de semis : éviter les périodes de stress => épié avant la sécheresse

Choix de la variété : robuste, tardive

Apports d'azote organique plutôt que minéral  
Apport minéral précoce

### Récolte

Remplacement par du sorgho fourrager (besoins en eau très faible) – le maïs pourrait se retrouver dans des conflits d'eau

## MAÏS : pistes d'atténuation

### Limiter les émissions de GES

Réduire la volatilisation de l'azote : incorporation rapide d'effluents (dans la semaine), épandeur à lisier type pendillard plutôt que buse

Moins de carburants : conduite éco, éteindre à l'arrêt, puissance adaptée aux besoins, interventions regroupées et réduites au strict nécessaire

Moins d'engrais de synthèse

Bonnes pratiques d'épandage d'engrais : fractionnement, respect du PPF, CIPAN, conditions climatiques (pluie, vent, hygrométrie...)

### Produire de l'énergie verte

Méthanisation

Photovoltaïque

### Stocker du carbone

Implantation de haies, bandes tampon...

**Contacts et rédaction :**

Antoine Villard - Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire

06 75 35 25 23 - [avillard@sl.chambagri.fr](mailto:avillard@sl.chambagri.fr)

**Réalisation graphique :** Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté

**Crédits photos :** Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté et [www.pixabay.com](http://www.pixabay.com)

**Imprimé par nos soins.**

