

# L a chronique **Ovine**

Semaine 51 du 21 décembre 2018

## Le pis de bois est une ancienne mammite



Dès l'agnelage, l'un ou les deux quartiers mammaires sont durs, froids et sans aucune goutte de lait ! « A ce stade, ce type de mammite est irréversible », explique Pierre Autef, vétérinaire praticien à Bellac (87). Autrement dit, la brebis doit être réformée, son ou ses agneaux élevés au biberon ou bien candidats à l'adoption. Ce type de mammite, appelée couramment « pis de bois » peut avoir plusieurs origines. La plus courante est liée à une ancienne mammite qui s'est

développée lors du tarissement. « Les sevrages progressifs et tardifs, avec des agneaux lourds qui continuent à téter en donnant des coups de tête dans le pis pour faire venir le lait, favorisent les pis de bois, explique Pierre Autef. Cela provoque des mammites non détectables cliniquement avec fibrose et induration du parenchyme mammaire. Les brebis n'ont pas de lait lors de la lactation suivante ». L'agalactie contagieuse à *Mycoplasma agalactiae* peut également provoquer ce syndrome. « C'est une affection plutôt localisée au pays Basque. Les formes visibles sont rares, mais il n'est pas exclu de les voir survenir notamment chez les primipares ».

*Photo semaine 51-18 : les sevrages tardifs avec de gros agneaux qui tètent favorisent les pis de bois*

CP : Ciirpo

Réseau de références ovin de Bourgogne et Laurence Sagot (Institut de l'Élevage/CIIRPO)