

L a chronique Ovine

Semaine 37 du 17 septembre 2021

Les parasites internes de saison



Si les strongles gastro intestinaux peuvent imposer un traitement dès la fin du printemps, l'haemonchus (le plus redoutable d'entre eux) aime la chaleur et l'humidité.

Ce parasite est surtout présent en été. Le ténia induit des baisses de performances et de la mortalité exclusivement sur les animaux sensibles, c'est-à-dire pâturent depuis moins de 4 mois. Au-delà, ils sont immunisés.

Les premiers effets de la Petite Douve se font surtout ressentir en automne. Logée dans les canaux biliaires, elle nuit au bon fonctionnement de la digestion. Il est donc particulièrement important que les brebis en soient débarrassées un mois et demi avant la mise-bas. Par ailleurs, certains médicaments n'éliminent que les larves de plus de 8 semaines. Il est donc normal de retrouver des œufs dans les analyses de crottes après un traitement.

Des analyses de crottes pour statuer

La Grande Douve, présente en fin d'été et en automne, est révélatrice de zones humides. Le constat est le même pour le paramphistome qui est surtout pathogène lorsque les parasites adultes sont présents en quantité importante. La coccidiose reste rare au pâturage. Seules les périodes sèches avec des agneaux couchés tous au même endroit (autour des râteliers par exemple) restent des conditions favorables. L'animal infesté qui héberge des coccidies dans son intestin va rejeter des œufs du parasite (ookystes) dans ses fèces. Les ookystes vont alors trouver des conditions favorables à leur développement, comme en bergerie. Dans tous les cas, les adultes s'immunisent contre les coccidies. Enfin, les oestres sont dues à des mouches spécifiques (*oestrus ovis*) qui pondent à l'entrée des narines. Elles apparaissent en automne sur des zones favorables à leur développement.

Affiche semaine 37-21 : Un animal en bon état est plus résilient (faculté de s'adapter) face aux parasites
CP : CIIRPO

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Élevage/CIIRPO)