



a chronique **Ovine**

Semaine 1 du 7 janvier 2022

Le retour de la gale



Les symptômes de la gale sont caractéristiques : les brebis se grattent, se mordillent et se frottent sur tous les supports possibles. Leur laine tombe en lambeaux. Celle des agneaux présente des tâches blanchâtres. « *Faire établir un diagnostic est indispensable car il y a trois types de gale, souligne Delphine Audureau, vétérinaire à la Coopérative Départementale Agricole Action Sanitaire de la Haute-Vienne. Le vétérinaire procède simplement à un grattage de la peau* ».

Cette maladie, due à un acarien est en effet très contagieuse. « *Les brebis du même troupeau se contaminent rapidement mais celles des voisins également, ajoute Delphine. Il suffit que la brebis malade se frotte à un poteau de clôture pour qu'un animal indemne situé de l'autre côté se contamine* ».

Une possible apparition de résistance

« *En règle générale, une ou deux injections d'endectocides à 8 jours d'intervalle suffisent, indique la vétérinaire. Mais attention, il y a plusieurs conditions à cela. Tout d'abord, les animaux doivent tous être traités, y compris les agneaux (prendre en compte le délai d'attente pour la commercialisation). Et le traitement doit être fait le même jour ! Enfin, un vide sanitaire de 4 semaines ou le traitement du bâtiment avec un produit contre la gale est indispensable* ». Depuis quelques temps, il semblerait qu'apparaissent des cas de résistance à l'ivermectine. « *Dans ce cas, la baignade est la seule solution, lorsque la température extérieure le permettra* ».

Pour en savoir plus, vous disposez d'une fiche technique CIIRPO : « la gale ovine : une maladie très contagieuse » sur idele.fr et inn-ovin.fr.

Photo semaine 1-22 : la gale est facilement identifiable en observant le troupeau
CP : CIIRPO

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Elevage/CIIRPO)