


Météo de l'herbe du 25 mai 2021

Conditions de pâturage difficiles.

Avec des précipitations très importantes et de la fraîcheur, la croissance d'herbe marque le pas, mais c'est avant tout les conditions de pâturage qui sont pénalisées sur des sols saturés en eau. Des temps de pause au bâtiment ont parfois été nécessaires avec un complément à l'auge. Espérons que des conditions plus favorables arrivent pour assurer le début de la fenaison en plaine et sur les 1ers plateaux afin de dégager des parcelles en fauche.



Repères conduite du troupeau : 17 au 24 Mai 2021

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	25,2	24,1	26,3	28,5	25,0	25,8
TB Moyen (g/kg)	37,4	40,3	37,8	40,3	38,0	39,8
TP Moyen (g/kg)	33,7	33,8	33,5	32,6	34,5	34,1
Valorisation ration de base (kg)	16,0	14,8	17,1	20,0	16,3	14,1
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	49,7	52,4	47,6	61,0	47,5	62,0
g de concentrés / kg de lait	166	179	153	157	159,4	202

Point de vue de l'éleveur : BINDIT Claude, associé au GAEC de la Mosiere à Echenans-sous-Mont-Vaudois

Le troupeau, constitué de 115 VL, pâture la journée. Le pâturage de nuit a seulement débuté le 24/05.

Avec une meilleure portance du sol, le pâturage tournant et rationné est mis en place. Les chemins en dur facilitent notre gestion du pâturage. Les conditions climatiques jusqu'à ce jour n'ont pas permis un suivi régulier de la pousse de l'herbe, nous avons donc privilégié des parcelles plus sèches. Nous adaptions le temps de pâturage en fonction de la météo, très humide ces derniers temps. Deux fenêtres météo ont permis de récolter de l'enrubanné qui sera distribué au troupeau cet hiver ; 50% des surfaces ont été fauchées. Le rendement obtenu est bon et l'analyse de fourrage est en cours. Cette semaine nous espérons finir les enrubbannés, semer les maïs et broyer les refus présents dans les pâtures. Jusqu'à hier, une demi-ration était distribuée mais avec une sortie au pâturage de jour comme de nuit la ration distribuée à l'auge sera constituée de 30 à 40% de la ration hivernale. L'utilisation de coproduits permet une maîtrise des coûts et une flexibilité pour le bilan fourrager. Les stocks sont positifs pour assurer la suite même si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas. Au dernier contrôle, les vaches produisent en moyenne 29,2 kg de lait pour un potentiel moyen de 9400 kg ; et avec des taux correct.

Propos recueillis par Alexandra Vauthier, conseillère d'élevage à GEN'IAtest.



Retrouvez le dernier épisode de Radio Prairies sur la [chaîne YouTube du Groupe Herbe Franche-Comté](#)


Groupe Herbe Franche-Comté

Réalisé avec le soutien financier de :




REGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

