


Météo de l'herbe du 30 mai 2023

Gérer le pâturage pour préserver des repousses feuillues

Retour de conditions météo favorables avec un vent du nord soutenu. Les stades des plantes évoluent avec des montées à épis qu'il faut gérer pour limiter les refus. Leur fauche ou le topping (fauche des refus avant de les pâturer) sont réduits si le pâturage tournant a pu être maîtrisé. Les chantiers de fenaison se terminent en plaine et s'activent en montagne, ce qui permettra de réintégrer des parcelles en complément du pâturage.




Repères conduite du troupeau : 22 au 29 mai 2023

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait par vache (Kg/VL)	24,8	24,3	25,7	26,1	24,3	26,4
TB (g/Kg)	36,5	37,7	37,6	39,5	37,2	38,2
TP (g/Kg)	33,6	33,5	33,7	33,2	33,4	33,3
Coût total ration (€/1000 Kg de lait)	104,2	132,8	95,5	170,5	107,9	152,3
Coûts concentrés + mrx (€/1000 Kg de lait)	72,0	74,0	66,2	98,8	65,5	100,6
g concentrés / Kg de lait	171	213	140	207	146	219


Point de vue des éleveurs : Albert LOZEMAN – SCEA Lozeman à Mazerolles-le-Salin (25)

La pousse de l'herbe a été difficile à gérer au printemps cette année. Le mois d'avril a été relativement froid avec une pousse de l'herbe plus ralentie, puis la pousse a explosé sur le mois de mai et nous nous sommes vite retrouvés débordé. Nous espérons repartir sur de bonnes bases après les foins. Les vaches pâturent actuellement jour et nuit, avec une complémentation de 1kg/VL/j de mélange triticales-poïs et 2kg de foin. Nous avons commencé les foins au 24 mai et nous espérons terminer à la fin de la semaine. Il y a de la quantité et la qualité semble correcte même si nous avons débuté un peu plus tard que les autres années. Propos recueillis par Tiffany DEGUIN, conseillère à Interbio Franche-Comté.

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

