




## Calendrier fourrager



## Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Degrés cumulés depuis le 1 <sup>er</sup> février
Avrée	302	87	198	122
Chateau-Chinon	598	130	160	96
Clamecy	215	63	219	130
Dun les Places	598	137	147	90
Lormes	485	94	191	110
Luzy	300	91	192	120
Montigny en Morvan	285	95	195	116
Nevers	175	64	225	131
Prémery	260	93	211	125

Situation météo au 20 février 2022 d'après données MétéoFrance

La semaine dernière a permis de cumuler 60°C supplémentaires. Les 200°C base 0 au 1er janvier sont maintenant atteints dans les zones les plus précoces du département. Les prairies vont reverdir et vont alors avoir besoin d'azote. Pour l'instant, aucune précipitation n'est annoncée la semaine prochaine, la portance devrait alors être au rendez-vous pour fertiliser dans de bonnes conditions. Une quinzaine de millimètres de précipitations sera néanmoins nécessaire pour valoriser l'engrais apporté.

## Mise à l'herbe des ovins : possible pour les brebis sevrées

La météo ensoleillée prévue pour la semaine prochaine est idéale pour mettre à l'herbe des ovins. Les brebis ayant agnelé à l'automne pourront ressortir sitôt les agneaux sevrés. Ce lâcher précoce va permettre de nettoyer les pâtures des résidus d'herbe de la saison dernière et assurer de belles repousses en suivant. Mieux vaut ensuite privilégier un changement fréquent de parcelle plutôt que de pâturer trop ras.



## ■ Pâturage tournant : quels avantages à sa mise en œuvre ?

L'objectif du pâturage tournant est d'offrir en permanence aux animaux une herbe jeune, au stade feuillu, donc d'excellente valeur alimentaire. Il permet de ne pas se faire dépasser par la pousse de printemps qui engendre un gaspillage d'herbe important en pâturage continu. Cette méthode de pâturage présente ainsi les avantages suivants :

- Pas d'herbe gaspillée,
- Amélioration de l'autonomie fourragère (chargement plus élevé au pâturage donc plus de surfaces disponibles pour la fauche),
- Diminution de la consommation de concentrés tout en maintenant les croissances des jeunes animaux.

## ■ Une anticipation nécessaire à sa réussite

Les clôtures et le découpage du parcellaire doivent être effectués en hiver afin de pouvoir lâcher les animaux dès que les conditions s'y prêtent. Une mise à l'herbe précoce (dès 350°C cumulés depuis le 1<sup>er</sup> février) est indispensable pour la réussite du pâturage tournant.

Pour réussir son découpage du parcellaire, il faut d'abord réfléchir aux nombres de lots d'animaux qui doivent être créés pour le pâturage et ensuite attribuer à chacun d'entre eux une surface à pâturer, appelée surface de base (40 à 50 ares par UGB, en fonction du potentiel de la prairie). Celle-ci doit ensuite être découpée en paddocks, de tailles homogènes dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes existantes (points d'eau, haies, etc). Un minimum de cinq paddocks dont un fauchable est indispensable pour réaliser un pâturage tournant efficace.

**Exemple :** 1 lot de 20 vaches suitées et un taureau dans une prairie avec un potentiel plutôt faible devra disposer de 10,5 ha (21 UGB\*0,5 ares/UGB). Ces 10,5 ha seront à découper en 5 paddocks (minimum !) de 2,1 ha.

**Envie de mettre en place le pâturage tournant sur votre exploitation ?**

**Contactez les conseillers de la Chambre d'Agriculture :**

**Nord : Charles Duvignaud - 0633270260**

**Sud : Christophe Dagouneau - 0633639132**