


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Agro – Météo

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Soutenu par
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	215	385
Chateau-Chinon	598	320	304
Clamecy	215	177	398
Dun les Places	598	362	289
Lormes	485	290	335
Luzy	300	272	380
Marzy	175	178	406
Montigny en Morvan	285	266	380
Prémery	260	239	384

Situation au 19 mars 2024 (d'après données Météo-France)

La végétation a profité des conditions printanières : la pousse d'herbe s'est nettement accélérée et les conditions de ces derniers jours étaient idéales pour débiter la mise à l'herbe, avant le retour de conditions moins propices à partir de samedi. Le déprimage des parcelles de fauche peut se poursuivre en cas de hauteur d'herbe insuffisante dans les pâtures. Attention toutefois dans les secteurs les plus précoces, les 500°C cumulés depuis le 1^{er} février vont être atteints probablement avant la fin du mois. Passé ce repère, le rendement en fauche de la prairie sera pénalisé.



Engraissement 100% au pâturage, c'est possible

Des essais menés en 2021 et 2022 à la ferme expérimentale des Bordes, dans l'Indre, ont montré qu'un engraissement des vaches de réforme sur la période printanière était possible avec une ration composée à 100% d'herbe pâturée. Cette pratique permet ainsi de finir des animaux avec une autonomie alimentaire totale de la ration d'engraissement et zéro coût de mécanisation, permettant ainsi de produire de la viande à moindre coût.

La régularité de la pluviométrie en 2021 a assuré une pousse de l'herbe en quantité suffisante, y compris en été. Aucune complémentation n'a donc été nécessaire pour le lot « pâturage ». En 2022, en revanche, la sécheresse précoce a fait chuter la pousse de l'herbe dès la mi-juin. Les dernières vaches du lot pâturant ont donc reçu une complémentation à base de 3 kg de blé aplati le dernier mois d'engraissement. Pour ces deux années, l'autonomie protéique est de 100 %, sans recours au correcteur azoté au pâturage. Pour le lot en bâtiment, il a fallu plus fortement compléter en 2022 car le foin était de qualité médiocre. L'engraissement au pâturage aura permis d'économiser 120 kg de tourteau de colza par vache.

Le pâturage tournant permet en effet aux animaux de bénéficier en permanence d'une herbe de bonne valeur alimentaire, similaire à celle d'un aliment complet du commerce. Les croissances sont ainsi au rendez-vous (1000 à 1200 g de GMQ selon l'année) et les carcasses présentent des caractéristiques similaires à celles du lot témoin engraisé en stabulation (poids, conformation, état d'engraissement).



Les prairies redémarrent



Luzerne de deuxième année, Cervon



Ray-grass hybride + trèfle violet, Vauclaix : les ray-grass sont au stade 2 nœuds, dernière feuille sortante.



Méteil : triticale, avoine, pois fourrager, vesce commune, Chateauneuf Val de Bargis : toutes les espèces sont bien présentes en sortie d'hiver.