

■ Enfin la fin des foins, fauche des deuxièmes coupes

Le retour des conditions estivales vont permettre de terminer les chantiers de fenaison. Les fourrages récoltés à cette époque seront particulièrement encombrants et de faible valeur alimentaire. Il est conseillé de les stocker séparément de ceux récoltés en juin de manière à pouvoir les distribuer aux animaux ayant les plus faibles besoins (par exemple aux vaches tarées). Les deuxièmes coupes de luzerne sont généralement fleuries. La récolte peut se faire sous forme de foin ou d'enrubannage. L'enrubannage permet de travailler un fourrage moins cassant et donc de limiter le risque de perte de feuilles. Quel que soit le mode de récolte envisagé, une manipulation du fourrage tôt le matin en présence de rosée limitera ces pertes. Pour une récolte en enrubannage, l'étape du fanage peut être supprimée si le fourrage est exposé au soleil au moment de la fauche.

■ Dérobées, un été favorable à la pousse



Maïs (avec repousses d'avoine volontairement conservées pour l'ensilage) et teff-grass semés début juin après récolte d'un MCPI : des développements satisfaisants grâce à la pluviométrie du début d'été



Luzerne semée le 31 octobre 2020 dans un MCPI. Ensilage du MCPI le 28 mai 2021, la luzerne est bien installée malgré un semis tardif (photo CA 58).