




Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} janvier
Avrée	302	168	159
Chateau-Chinon	598	263	117
Clamecy	215	133	175
Dun les Places	598	225	110
Lormes	485	233	126
Nevers	175	129	183
Prémery	260	125	165

Données météo au 14 février 2021 (Source : Météo France)

La météo hivernale de la semaine dernière a figé les sommes de températures. La douceur des jours à venir va permettre d'atteindre les 200°C rapidement sur la majeure partie du département, à l'exception des zones les plus froides du Morvan. Ces 200°C cumulés indiquent le redémarrage de la végétation. Il va être temps de réaliser les premiers apports d'azote sur les MCPI et les prairies destinées aux récoltes précoces (ensilage et enrubannage) ainsi que les pâtures. Rien ne presse cependant, car pour être totalement valorisé, l'apport d'azote a besoin d'être suivi de précipitations significatives (15 à 20 mm d'eau), non prévues à l'heure actuelle.

Fertilisation précoce, ne pas négliger les pâtures

Une fertilisation précoce des pâtures dès 200°C cumulés va augmenter la quantité d'herbe disponible au printemps, permettant ainsi une mise à l'herbe plus précoce des animaux et donc une économie de fourrage et de paille.

Fertiliser les pâtures permet également d'avoir un chargement au pâturage plus élevé et donc de disposer de plus de surfaces dédiées à la récolte.



Faire un état des lieux de ses stocks fourragers pour anticiper la fin de l'hiver

A cause d'une longue période d'affouragement estival, les stocks de nourriture s'amenuisent. Faites un état des lieux de ceux-ci pour anticiper un éventuel manque de fourrage avant la fin de la période d'hivernage.

Les besoins quotidiens des bovins sont de l'ordre de 14 kg de matière sèche par UGB.

- ❖ 1 vache suitée = 1 UGB /
- ❖ 1 génisse de deux ans ou une vache gestante = 0,8 UGB
- ❖ 1 génisse d'un an = 0,6 UGB

→ Si le volume de fourrage encore disponible est supérieur à 80% des besoins du cheptel d'ici à la mise à l'herbe, l'achat de fourrage de s'impose pas, un réajustement des rations est généralement suffisant pour « aller au bout ».

→ Si le volume de fourrage encore disponible est inférieur à 80% des besoins du cheptel jusqu'à la mise à l'herbe, il faut étudier les pistes d'adaptation possibles (anticipation de la mise à l'herbe de certaines catégories, vente d'animaux de réforme, ajustement des rations,...) mais l'achat de fourrage risque d'être inévitable dans certaines situations.

En parallèle d'éventuels achats de fourrages, assurez-vous de ne pas nourrir d'animaux improductifs : ceux-ci coutent cher et pénalisent l'autonomie fourragère.

Chaque situation est unique et il n'existe par conséquent pas de solution universelle : contactez les conseillers de l'équipe élevage pour être accompagné dans vos prises de décisions.



Formation « Je me lance dans le pâturage tournant »

La gestion de l'herbe au pâturage est la principale clé pour améliorer son autonomie fourragère et diminuer ses charges d'alimentations en bovins allaitants.

La première session de la formation « Je me lance dans le pâturage tournant » aura lieu le jeudi 25 février après-midi. Cette formation associe apports théoriques et mise en pratique du pâturage tournant sur son exploitation.

Renseignements et inscriptions auprès de Charles Duvignaud – 06.33.27.02.60