




Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	209	372
Chateau-Chinon	598	331	324
Clamecy	215	168	382
Dun les Places	598	326	293
Lormes	485	308	357
Nevers	175	162	377
Prémery	260	169	360

Données météo au 28 mars 2021 (Source : Météo France)

Le printemps est là...avant le retour de l'hiver


La pousse d'herbe est globalement toujours faible (10 à 20 kg de MS/ha/jour) et les quantités d'herbe sur pied sont hétérogènes selon les secteurs. A l'exception des zones les plus en altitude du Morvan, les stocks d'herbe sur pied sont cependant suffisants pour effectuer la mise à l'herbe. Celle-ci a pu se dérouler dans des conditions idéales en ce début de semaine. La semaine prochaine s'annonce hivernale et ne sera pas favorable au lâcher d'animaux.

Attention aux mises à l'herbe tardives : la végétation évolue vite au printemps et dès 750°C cumulés, les graminées les plus précoces vont durcir et seront boudées par les animaux, générant l'apparition de refus.



■ Ray-grass italien : faucher tôt pour concilier volume et qualité du fourrage

Le ray-grass italiens semés en fin d'été qui n'ont pas été exploités à l'automne affichent déjà des biomasses importantes. Une récolte précoce présente l'avantage de récolter un fourrage de bonne valeur alimentaire et de favoriser les repousses dans l'optique d'une seconde récolte. Compte-tenu du coût actuel des tourteaux, la recherche de protéines dans les fourrages est une solution pour limiter la proportion de concentrés dans les rations.



Evolution des valeurs nutritives du ray-grass d'Italie non alternatif au premier cycle (année après le semis) en fonction du stade et du rendement (Source : Arvalis)

Un fourrage récolté précocement (avant début épiaison) aura des bonnes valeurs en énergie et en azote, permettant de baisser la proportion de concentrés dans les rations ou d'utiliser ses fourrages pour des animaux à forts besoins (vaches en lactation, engraissement). Lorsqu'on s'approche de la fin montaison, les valeurs nutritives chutent fortement. Les observations faites ce début de semaine montrent des RGI déjà bien évolués → les récoltes devraient pouvoir débuter d'ici environ trois semaines pour une récolte avant la sortie des épis.



Ray-Grass d'Italie, photos prises le 30 mars 2021



Si le ray-grass d'Italie est une culture dérobée, une récolte précoce préservera la réserve utile pour le maïs à suivre.