


POINT FOURRAGES

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

25/03/2020

N°10

Calendrier fourrager



Agro – Météo


| Station météo | Altitude (m) | Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm) | Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février |
|----------------|--------------|---|--|
| Avrée | 302 | 167 | 423 |
| Chateau-Chinon | 598 | 293 | 408 |
| Clamecy | 215 | 158 | 451 |
| Dun les Places | 598 | 308 | 353 |
| Lormes | 485 | 240 | 400 |
| Nevers | 175 | 161 | 451 |
| Prémery | 260 | 212 | 443 |



Données météo au 22 mars 2020 (Source : Météo France)

Une météo défavorable à la pousse

Les forts cumuls de températures de la semaine dernière (environ 80°C), à la suite d'un début de mois pluvieux, ont été favorables à la pousse. Malheureusement celle-ci a été de courte durée et les conditions de cette semaine ont complètement stoppé la croissance de l'herbe. Des animaux ont été lâchés sur certains secteurs et profitent du soleil. La mise à l'herbe peut se poursuivre dans les parcelles où la disponibilité en herbe est suffisante, en particulier pour les lots conduits en pâturage tournant où le démarrage est essentiel à la réussite du premier cycle.



Conditions favorables pour le pâturage

Il est important de commencer le pâturage (ou l'affouragement en vert) de bonne heure, dès que la quantité d'herbe disponible est suffisante (8 à 10 cm à l'herbomètre, soit herbe à hauteur de la cheville), pour maîtriser la qualité de l'herbe durant toute la période printanière.

Afin d'assurer une bonne transition alimentaire, commencer le pâturage de façon progressive, en sortant les chèvres de préférence l'après-midi, à la suite d'un repas de foin assez fibreux le matin.

La valeur alimentaire de l'herbe jeune équivaut à celle d'un concentré, les apports d'aliments doivent alors se réduire en conséquence :

- en cas d'utilisation d'un aliment complet, diminuer de 30% la quantité de concentrés distribuée, de façon progressive (-100g tous les 3 jours, pendant 2 semaines).
- avec un mélange fermier, céréales et correcteur azoté, diminuer de 25%, en adoptant la même mise en œuvre.

Le maintien de trois repas par jour est conseillé, en limitant la quantité de concentrés à 400g par repas.

La conduite du pâturage et de l'affouragement en vert se gère en surveillant deux indicateurs :

- la quantité de lait produite au tank
- la qualité du lait (fromageabilité, taux, niveau d'urée)

L'herbe de printemps est riche en vitamines mais pauvre en certains oligo-éléments (iode, magnésium et sélénium). Les apports d'oligo-éléments sont à maintenir, en plus du sel, pour éviter tout risque métabolique (tétanie d'herbage notamment).



Vos interlocuteurs



Les conseillers élevage

03 86 93 40 60

elevage@nievre.chambagri.fr


RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Avec la contribution financière
du conseil et d'allocations agricoles
«développement agricole et rural»