

POINT FOURRAGES


Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

15/04/2020

N°13



Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	167	622
Chateau-Chinon	598	294	645
Clamecy	215	158	642
Dun les Places	598	308	537
Lormes	485	240	619
Nevers	175	161	643
Prémery	260	212	634



Conséquences du gel de mars dans un MCPI

Données météo au 12 avril 2020 (Source: Météo France)

Retour de la douceur, une pousse toujours au ralenti

Le retour de la chaleur (plus de 100°C cumulés la semaine dernière) a permis une légère reprise de la pousse, bien en deçà cependant de qu'elle pourrait être à cette période de l'année en présence d'eau. La production d'herbe mesurée la semaine dernière est comprise entre 250 et 400 kg de MS/ha selon les parcelles. Les animaux consomment l'herbe plus vite qu'elle ne pousse et les stocks d'herbe sur pied diminuent rapidement.

Pour ne rien arranger, le gel de fin mars/début avril a eu des conséquences : gel des épis de raygrass dans certaines parcelles, gel des protéagineux dans les MCPI. Cette année plus encore, le moindre brin d'herbe se doit d'être valorisé afin de passer ce cap, en espérant un retour de la pluie pour espérer récolter des stocks conséquents aux mois de mai et juin.



Prairies

📌 Quelles solutions face au manque d'herbe ?

Si la première solution à mettre en œuvre est une conduite maîtrisée du pâturage qui permet de limiter le gaspillage grâce à une bonne gestion de l'herbe, d'autres pistes peuvent être creusées dès à présent :

- Anticiper des ventes d'animaux, lorsque cela est possible, afin de réduire le nombre d'UGB à nourrir (par exemple vente de laitons au sevrage à l'automne 2020 plutôt qu'à 18 mois au printemps 2021, anticiper les diagnostics de gestation et/ou le sevrage des vaches à réformer pour le vendre plus tôt dans l'été plutôt que d'attendre l'automne, ...)
- Dans les exploitations qui associent cultures et élevage, possibilité de faire pâturer des prairies prévues pour la fauche et récolter des céréales immatures pour constituer les stocks fourragers (l'intérêt dépend fortement du rendement potentiel et du prix de vente de la céréale par rapport à l'achat de fourrage). Ces parcelles libérées tôt pourront alors être implantées avec une culture fourragère en dérobée (bien que la réussite soit aléatoire et dépende des précipitations estivales)



Bovins

📌 Surveiller la présence de tiques sur les bovins

Au pâturage, les bovins sont exposés aux tiques. Ces parasites sont vecteurs de maladies infectieuses qui peuvent parfois être mortelles (piroplasmose, fièvre Q, erlichiose, anaplasmose,...). Les tiques (larves et nymphes adultes) se rencontrent principalement aux endroits suivants :

- Sur l'encolure
- Sur le chignon
- Au niveau des membres
- Près de la queue
- Sous le ventre et notamment autour de la mamelle

Inspectez vos animaux en parlez en avec votre vétérinaire !

Vos interlocuteurs



Les conseillers élevage

03 86 93 40 60

elevage@nievre.chambagri.fr

REGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Avec le soutien financier
du conseil régional de Bourgogne
et de l'État

Avec le soutien financier