

POINT FOURRAGES

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

10/06/2020

N°21



Prairies

Situation hétérogène selon les précipitations

Les précipitations des derniers jours ont été localisées dans le département et certains secteurs souffrent de déficit hydrique tandis que d'autres ont pu bénéficier de cumuls parfois supérieurs à 50 mm. Dans les situations où le stock d'herbe à pâturer diminue, ne pas précipiter le retour sur les parcelles fauchées. Mieux vaut bloquer les animaux et les affourager quelques jours afin d'avoir des repousses suffisantes à pâturer.

Les prévisions météorologiques annoncent un temps instable jusqu'au 20 juin, rendant difficile la reprise des chantiers de fenaison. Les conditions sont en revanche favorables aux implantations de dérobées fourragères après MCPI (sorgho fourrager, moha,...) : une levée rapide est souvent gage de réussite.



Le sorgho est sensible à la concurrence : une germination rapide favorise son installation



Bovins viande

Anticiper de faibles disponibilités en paille

Les quantités de paille-litière à prévoir varient de 900 kg (système naisseur-vêlage tardif) à 1500 kg (système naisseur-engraisseur) par UGB. D'autres facteurs doivent être pris en compte : type de bâtiment (présence d'aires raclées), type d'alimentation (foin ou ensilage), densité animale en bâtiment, etc. Il faut ajouter à ces quantités les besoins éventuels en paille alimentaire. Les rendements en paille s'annoncent en baisse pour la récolte à venir. Il convient d'anticiper en recherchant des surfaces supplémentaires ou en se positionnant sur des litières alternatives (copeaux, sciure, dolomie, balle de riz,...).



Ne pas précipiter le sevrage des agneaux d'herbe

Si le sevrage des agneaux d'herbe a traditionnellement lieu à l'âge de 4 mois, celui-ci ne doit pas être systématique pour autant.

- En cas d'agneaux déjà complémentés le niveau de consommation de concentrés est un bon indicateur pour décider du moment du sevrage. Une consommation quotidienne inférieure à 500 g de concentrés par agneaux est signe d'une disponibilité en herbe de qualité suffisante pour satisfaire les besoins des agneaux. Les brebis peuvent alors être maintenues en lactation.
- Dans le cas d'agneaux non complémentés, si la disponibilité en herbe de qualité est suffisante et que les brebis sont en bon état, la lactation peut être prolongée. Si la ressource en herbe est insuffisante ou de qualité médiocre (graminées épiées), le sevrage des agneaux est à prévoir.



Si la consommation de concentrés avant sevrage est inférieure à 500 g/jour, la transition alimentaire doit durer environ un mois afin que le système digestif des agneaux s'habitue à son nouveau régime alimentaire. Le foin doit être le fourrage privilégié en début de transition car il se rapproche plus de l'herbe que la paille et sera ainsi mieux consommé par les agneaux.

Valoriser les repousses pour économiser les concentrés

La finition des agneaux peut avoir lieu exclusivement en bergerie (ration sèche) ou bien au pré (avec ou sans complémentation).

Pour une finition exclusivement au pâturage, les agneaux doivent pâturer une prairie riche en légumineuses, idéalement des repousses de prairies temporaires enrubannées ou ensilées au printemps. Ces repousses de fauche présentent également l'avantage d'être indemnes de parasites. La hauteur d'herbe d'entrée des animaux doit être comprise en 5 et 8 cm (herbe à hauteur du talon). Si l'herbe vient à manquer ou si le chargement est important (supérieur à 25 agneaux par hectare), un apport de concentrés est toutefois nécessaire.

Vos interlocuteurs



Les conseillers élevage

03 86 93 40 60

elevage@nievre.chambagri.fr